



# CALENDARIO DE CULTIVOS

## Semillero

## A tierra

## Cuidados

## Recolección



apio

En septiembre, en semilleros de celdilla. Humedecer antes el sustrato.

En noviembre, dejando 30 cm. entre plantas y entre líneas.

Antes de la siembra abonar bien. Según crece, necesita aporcar y amarrar para que el interior quede tierno.

De marzo a abril.



acelga

De octubre a noviembre. Remojar primero las semillas, poner en semillero a 2 cm. de profundidad.

A partir de diciembre, 30 cm. entre plantas, 40 cm. entre líneas.

Precisa escarda frecuente y acolchado. Si es preciso aclarar para facilitar le desarrollo.

A partir de febrero ir cortando y consumiendo las hojas más verdes, la planta seguirá creciendo.



coliflor

Septiembre y octubre, poner dos semillas por celdilla, enterrar menos de 1cm.

Oct a Dic, cuando las plantitas hayan desarrollado tres hojas principales y yema central. Colocar a 40 cm.

Regar si las lluvias escasean. Revisar para evitar puestas de mariposa, la siembra cercana de apio las ahuyenta.

A partir de enero, una vez las flores hayan abierto y llenado su espacio



lechuga

En todo tiempo, mejor de septiembre a abril. Casi superficial en semilleros de vasito o en almáciga.

Todo tiempo. En línea, en dos líneas sobre caballón o a los lados. 30 cm. entre planta y 30 cm. entre líneas.

Riego. Al principio proteger de sol intenso y de heladas. Atar las hojas para proteger interior.

En todo tiempo. Arrancar y cortar raíz. Dejar las subidas de tallo para semillas del año próximo.




espinaca

Septiembre a marzo, a chorrillo, 1cm. de profundidad, 40 cm. entre líneas. Hacer varias siembras espaciadas en el tiempo.

Entresacar, dejar una planta cada 10 cm. Riego si la lluvia escasea.

Noviembre a junio, cortar las hojas externas según crezcan y consumir.



habas

Sep a Nov. Tras la lluvia, mediante asientos de tres semillas separados 30 cm. 30 cm. entre líneas.

Encañar si se prevén vientos que puedan tumbar las plantas. Ojo con los pulgones.

A partir de febrero arrancar las vainas a medida que maduren. Triturar las plantas secas, incorporarlas a la tierra.



col

Abril a Nov., según sean coles de otoño, invierno o primavera. Dos semillas por celdilla, enterrar menos de 1cm.

Julio a Feb., según fecha de siembra en semillero y crecimiento de las plantitas. Colocar separadas 40 cm.

Regar si las lluvias son escasas. Conviene aporcar en las primeras semanas y revisar orugas. Exigente en abono.

De septiembre a julio, según fecha de siembra.



zanahoria

Sep/Oct y Marzo/Abril. En línea a chorrillo y posterior entresaca. 20 cm. entre líneas. Enterrar menos de 1cm.

Una vez crezcan las plantitas, entresacar dejando las más robustas cada 5 cm. Vigilar los topillos.

A partir de enero o junio, cuando se vea el crecimiento de la raíz. Humedecer la tierra antes de arrancar.



patata

Sep/Oct y Feb/May. Se siembran trozos de patata con una yema o más. Enterrar 10 cm. y 40 cm. entre cada una.

Cavado profundo y abonado. Cuidar afecciones por hongos.

Desenterrar después de florecer, cuando las hojas comiencen a secar. Guardar algunas para siembra siguiente.



rábano

Todo el año excepto Dic. y verano. A chorrillo, superficial, 40 cm/línea. Hacer varias siembras espaciadas en el tiempo.

Entresacar si están muy apretados. Riego si la lluvia escasea.

Según engorden, un mes aprox. a partir de la siembra. No dejar que endurezcan en tierra.

## Semillero

## A tierra

## Cuidados

## Recolección



cebolla

Agosto y septiembre. Entre diciembre y marzo la tardía

En enero y febrero o abril y mayo (la tardía), se llevan los cebollinos a la tierra

Escarda y labra cuando precise.

Mayo y junio, septiembre a octubre la tardía. Ver el engorde bajo la tierra.



ajos

De octubre a enero. Se siembra directamente el diente, 3 cm. profundidad y 20 cm. entre ellos y 30 entre líneas.

Escarda y labra cuando precise. Le vienen bien las cenizas para aportar minerales, mullir la tierra y evitar hierbas.

Cinco o seis meses tras la siembra, cuando las hojas sequen. Cortar el tallo de la flor para que engorden mejor.




guisantes

Sep/Oct y Feb/May. Sembrar mediante asiento, 2/3 semillas por golpe cada 40 cm. Enterrar 1/2 cm.

Preparar un sistema de cañas para facilitar el crecimiento de las plantas y la recogida. Ojo con los pulgones.

Aprox. cinco meses de la siembra, mirar el grano. Una vez recogidas las vainas, triturar la mata e incorporar al suelo.



judías verdes

De marzo a agosto. Dos semillas por asiento a 2 cm. profundidad. 60 cm. entre línea y 30 cm entre golpe.

Eliminar la planta más débil. Conviene montar cañas para facilitar la trepa y la recogida. Labra superficial y riego.

De junio a noviembre.



remolacha

De marzo a junio, asientos enterrados 2 cm., en línea. Aclareo posterior hasta dejar una planta cada 30 cm.

De mayo a septiembre.



tomate

Fin de febrero/marzo, dos pipas por celdilla poco enterradas, (1 cm. max.). Calor y riego

Fin de marzo/abril/mayo. Variedad baja una planta cada metro, variedad alta una planta cada 60 cm.

Riego. Abonado. Las variedades altas necesitan cañas u otros elementos para trepar.

Junio a noviembre. Cortar, no arrancar



pimiento

Fin de febrero/marzo, dos pipas por celdilla poco enterradas, (1 cm. max.). Calor y riego

Fin de marzo/abril/mayo. Una planta cada 40 cm.

Riego. Abonado. Algunas variedades pueden necesitar cañas u otros elementos para trepar.

Junio a noviembre. Cortar, no arrancar.



calabacín

Fin de febrero/marzo, una pipa por celdilla enterradas 1.5/2 cm. Calor y riego

Fin de marzo/abril/mayo. Una planta cada 80 cm.

Riego. Abonado. El acolchado le favorece. Planta rastrera. Polinizar manualmente.

Mayo a noviembre. Cortar, no arrancar




berenjena

Fin de febrero/marzo. Las pipas se humedecen una noche antes, una por celdilla poco enterradas, (1 cm. max.) y abonadas.

Fin de marzo/abril/mayo. Una planta cada 80 cm.

Riego. Abonado. Algunas variedades pueden necesitar cañas u otros elementos para trepar.

Julio a septiembre. Cortar, no arrancar



pepino

Durante febrero y marzo, dos pipas por celdilla poco enterradas, (1 cm. max.). Calor y riego

Fin de marzo/abril/mayo. Una planta cada 60 cm.

Riego. Abonado. Planta rastrera que necesita espacio para desarrollarse

Junio a septiembre.

# CALENDARIO DE CULTIVOS

